

VARIAN PHARMED		Colors: ● PANTONE 801 C ● Black
Leaflet:	Methocarbamol 1g	
Size:	170 x 170 (mm)	
Date:	1400/07/10	

170 mm

بزرگسالان نباید بیش از ۳ گرم در روز (۳ آمپول) و بیش از ۳ روز متوالی باشند. (به جز در درمان کزاز)

گرفتگی عضلانی

برای علائم متوسط، ۱ گرم IM یا IV به عنوان تک دوز ممکن است کافی باشد. در صورت تزریق IV، سرعت تزریق از ۳ میلی لیتر در دقیقه بیشتر نباشد و هم چنین زمانی که تزریق عضلانی انتخاب میشود نباید بیش از ۵ میلی لیتر به هر ناحیه گلوئال تزریق کنید به همین دلیل این آمپول در دوسرنگ ۵ میلی لیتری در دو طرف عضله باسن تزریق میشود.

دوز دارو و تعداد دفعات تزریق باید بر اساس شدت بیماری و پاسخ درمانی باشد.

درمان کمکی کزاز

بزرگسالان:

شواهد بالینی نشان می دهد که متوکاربامول می تواند در کنترل مشکلات عصبی-عضلانی که به علت بیماری کزاز به وجود آمده، موثر باشد.

تزریق اولیه یک یا دو آمپول (۱-۲ گرم IV یا سرعت ۳۰۰ میلی گرم در دقیقه) و سپس یک یا دو گرم ممکن است اضافه شود تا در مجموع ۳ گرم (سه آمپول) به عنوان دوز اولیه داده شود.

این روش باید هر شش ساعت تکرار شود تا زمانی که شرایط برای قرار دادن لوله بینی - معده (NG) فراهم شود.

نوزادان، کودکان و نوجوانان:

در ابتدا، ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم (یا ۵۰۰ میلی گرم به ازای هر متر مربع) IV هر ۶ ساعت در صورت نیاز تزریق شود. ماکسیمم دوز مصرفی به صورت وریدی ۱/۸ گرم به ازای هر متر مربع در روز برای سه روز متوالی است.

موارد منع مصرف

• در صورت حساسیت به متوکاربامول یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده دارو از مصرف آن خودداری نمایید.


• تزریق متوکاربامول در بیماران با اختلالات یا نارسایی کلیوی و یا مشکوک به هر نوعی از بیماری های کلیوی منع مصرف دارد. پلی اتیلن گلیکول موجود در این دارو سبب افزایش اسیدوز و احتباس اوره در بیماران مبتلا به نقص کلیه میشود.

• تجویز وریدی متوکاربامول برای بیماران با سابقه صرع و تشنج توصیه نمی شود.

متوکاربامول

۱ گرم / ۱۰ میلی لیتر

METHOCARBAMOL 1g



جهت تزریق عضلانی و وریدی

مطالب این برگه راهنما را قبل از مصرف دارو به دقت مطالعه کنید.

این فرآورده، دارویی تخصصی است که برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در آینده و در شرایط مشابه وضعیت کنونی و بدون اطلاع پزشک پرهیزید، همچنین از توصیه آن به دیگران که علائمی همچون شما دارند، جدا خودداری کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این دارو با پزشک معالج یا داروساز خود مشورت نمائید، یا می توانید به سایت www.varianpharmed.com مراجعه کنید.

شکل دارویی

متوکاربامول تولیدی شرکت داروسازی واریان فارمد به صورت آمپول حاوی ۱ گرم در ۱۰ میلی لیتر، در بسته بندی ۵ عددی به همراه برگه راهنما به بازار عرضه می گردد.

موارد مصرف

متوکاربامول یک داروی شل کننده عضلانی است که به طور عمده بر روی سیستم عصبی مرکزی اثر کرده و به طور مستقیم بر روی عضلات اسکلتی اثر نمی کند. متوکاربامول در درمان کوتاه مدت اسپاسم عضلانی دردناک و درمان کمکی کزاز استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف

روند درمان با این دارو باید تحت نظارت دقیق پزشک معالج باشد. مقدار مصرف دارو و دوره درمان را پزشک معالج تعیین می کند.

این دارو فقط برای استفاده داخل وریدی و عضلانی است. دوز کل در

170 mm

VARIAN PHARMED		Colors: ● PANTONE 801 C ● Black
Leaflet:	Methocarbamol 1g	
Size:	170 x 170 (mm)	
Date:	1400/07/10	

170 mm

170 mm

هشدار و موارد احتیاط

- از آنجایی که متوکاربامول ممکن است دارای یک اثر مهارکنندگی در CNS باشد، بنابراین در مصرف همزمان این دارو با الکل و سایر داروهای ضد افسردگی باید احتیاط شود.
- متوکاربامول ممکن است باعث اختلال در واکنش‌های رفتاری شود. بنابراین در هنگام رانندگی و یا انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند از مصرف این دارو خودداری کنید.
- در بیماران با اختلالات کبدی با احتیاط مصرف شود.
- ایمنی و اثربخشی تزریق متوکاربامول در کودکان فقط در بیماری کزاز مشخص شده است.
- جهت انفوزیون وریدی آمپول (۱۰ میلی لیتر) را با حداکثر ۲۵۰ میلی لیتر از محلول کلرید سدیم ۰/۹ درصد یا محلول ۵ درصد دکستروز رقیق کنید. محلول رقیق شده را در یخچال قرار ندهید.

بارداری و شیردهی

- اگر در دوران بارداری یا شیردهی هستید یا قصد بارداری دارید، قبل از استفاده از این دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- استفاده از این دارو در بارداری در رده C قرار دارد و تجویز این دارو در بارداری فقط در شرایط خاص و با توجه به نظر پزشک مجاز می‌باشد. گزارشاتی مبنی بر آسیب به جنین و ناهنجاری‌های مادرزادی در اثر مصرف این دارو در دوران بارداری وجود دارد.
- ترشح این دارو در شیر به صورت دقیق مشخص نیست، مصرف آن در زنان شیرده باید با احتیاط صورت گیرد.

تداخلات

- قبل از مصرف این دارو، پزشک یا داروساز خود را از تمام داروهای دیگری که مصرف می‌نمایید و یا قصد مصرف دارید، مطلع سازید.
- متوکاربامول ممکن است اثر پیریدوستیگمین بروماید را مهار کند. بنابراین، در بیماران مبتلا به میاستنی گراویس که داروهای آنتی کولین استراز دریافت می‌کنند، متوکاربامول باید با احتیاط استفاده شود.
- در صورت استفاده همزمان متوکاربامول با سایر داروهای ضد افسردگی مانند باربیتوراتها، آمی تریپتیلین ممکن است باعث افزایش اثر این داروها شود. در مواقع لزوم کاهش دوز یک یا هر دو عامل ممکن است موثر باشد.
- داروهای ضد درد مانند اکسی کدون، هیدروکدون، ترامادول یا مورفین با متوکاربامول تداخل دارویی دارند.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً به پزشک مراجعه شود:

حالت تهوع و استفراغ، سوء هاضمه، سردرد، سرگیجه، بی‌خوابی، تاری دید و یا وزم ملتحمه و قرمزی چشم، واکنش‌های حساسیت بیش از حد از جمله بثورات، خارش، کهیر، آنژیوادم، احتقان بینی، ترومبوفلیت، کاهش فشارخون، سنکوپ، تب، دوبینی

پس از تزریق، بیماران ممکن است گرگرفتگی و طعم فلزی در دهان، برادی کاردی، تشنج و آنافیلاکسی و التهاب در محل تزریق را تجربه کنند.

نحوه مصرف

این دارو با تزریق داخل وریدی یا عضله مطابق با دستور پزشک شما انجام می‌شود. در صورت تزریق وریدی ممکن است پزشک معالج از شما بخواهد، در حین تزریق دراز بکشید و حداقل ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بعد از تزریق برای کاهش خطر عوارض جانبی در همان حالت باقی بمانید.

شرایط نگهداری

- دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.
- تاریخ انقضای دارو روی کارتن و آمپول ذکر شده است. لذا پس از این تاریخ از مصرف آن خودداری نمایید.
- از یخ‌زدگی دارو محافظت شود. به منظور محافظت در برابر نور در جعبه اصلی نگهداری کنید.
- بعد از باز شدن آمپول بلافاصله مورد استفاده قرار گیرد.
- محلول باید شفاف و عاری از ذرات باشد در غیر این صورت از مصرف آن خودداری نمایید.

منابع

- www.uptodate.com
- www.pdr.net



دارنده پروانه ساخت
شرکت تولیدی واریان فارمد، تهران، ایران