



For Veterinary Use Only  
**Paraffin**

Oral Liquid 1000ml.

فقط برای مصرف دامپزشکی

## پارافین مایع خوراکی

**مواد مصرف:** این دارو بعنوان ملین و نرم کننده مدفوع در انواع اختلالات دستگاه گوارش از جمله انباشتگی ها، سوء هاضمه، یبوست، نفخ و همچنین کولیک شنی اسب بکار می رود. پارافین موجب کاهش کشش سطحی محتویات شکمبه شده و بعنوان ضد نفخ، در درمان نفخ نشخوار کنندگان بکار می رود. این دارو در موارد انباشتگی مدفوع در انتهای روده بزرگ و اختلال در دفع مکنبیوم نوزادان از طریق رکتال تجویز می گردد.

**ترکیب:** هر بطری یک لیتری حاوی یک لیتر پارافین خوراکی دارویی مطابق با استاندارد BP و USP می باشد.

**شرایط نگهداری:** در ظروف در بسته و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.

**تداخل دارویی:** در صورت استفاده دراز مدت ممکن است باعث ایجاد اختلالات گوارشی از جمله اختلال در جذب مواد مغذی شود.

**زمان پرهیز از مصرف:** ندارد

**مقدار و نحوه مصرف:**

**اسب و گاو:** ۱ تا ۴ لیتر خوراکی

**گوساله و کره اسب:** ۶۰ تا ۱۲۰ میلی لیتر خوراکی با ۵۰ تا

۶۰ میلی لیتر رکتال جهت دفع مکنبیوم

**گوسفند و بز:** ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلی لیتر خوراکی با ۵ تا ۱۰

میلی لیتر رکتال جهت دفع مکنبیوم بره ها

**سگ:** ۲ تا ۶۰ میلی لیتر خوراکی

**گربه:** ۲ تا ۲۰ میلی لیتر خوراکی

در صورت لزوم تکرار درمان، بهتر است مقادیر فوق تقسیم شده روزانه در ۲ الی ۳ نوبت تجویز گردد.

**موارد احتیاط:** مقادیر درمانی توصیه شده بهتر است توسط لوله معدی خورنده شود تا از بروز احتمالی پنومونی استنشاقی جلوگیری بعمل آید. در مقادیر درمانی توصیه شده هیچگونه عوارض و اثرات جانبی گزارش نشده است. این دارو بی رنگ بوده و در صورت مشاهده تغییر رنگ از مصرف آن خودداری شود. از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری شود.

**بسته بندی:** ظروف پلی اتیلنی یک لیتری